


КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО:

Прием комбинации пектина, инулина, янтарной кислоты и таурина в комплексной терапии атопического дерматита способствовал:

- Уменьшению выраженности зуда в 3,7 раз.
- Уменьшению тяжести течения заболевания.⁴



КАК ПРИНИМАТЬ «ЖИДКИЙ УГОЛЬ»?



1 стик



2–3 раза в день



за 1 час до еды

Внимание! Между приемом любого лекарственного препарата и энтеросорбента должно пройти **не менее 1 часа**.

Биологически активная добавка к пище «ЖИДКИЙ УГОЛЬ® – гель для приема внутрь с пектином». Не является лекарством.
СРР № RU.77.99.57.003.E.002195.06.19 от 21.06.2019 г. ТУ 10.89.19-152-58693373-2018.
Форма выпуска: 9 стиков по 10 мл.
Состав: наполнитель – полидекстроза, вода очищенная, пектин, инулин, таурин, кислота янтарная, ароматизатор «яблоко», подсластитель – сукралоза.

ПРИЕМ 20–30 МЛ ПРОДУКТА ОБЕСПЕЧИТ ПОСТУПЛЕНИЕ:

Наименование компонента	мг	% ¹
Пектин	2000–3000	100–150*
Янтарная кислота	100–150	50–75
Таурин	400–600	100–150*
Инулин	400–600	16–24

Пищевая ценность в 100 г: пищевые волокна – 57 г.
Энергетическая ценность в 100 г: 456 кДж / 114 ккал.

¹ – % от адекватного уровня потребления согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продуктам питания (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, Раздел 1, Приложение 5).
^{*} – не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника пектина, инулина, таурина и янтарной кислоты.

Рекомендации по применению: взрослым по 1 стик (10 мл) 2–3 раза в день за 1 час до еды.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения: в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

Реализация: через аптечные учреждения, специализированные магазины по продаже диетических продуктов, специальные отделы продовольственных магазинов.

Срок годности: 2 года.

Изготовитель: ООО «ВТФ», РФ, 601125, Владимирская обл., Петушинский р-н, пос. Волыгинский, ул. Заводская, стр. 107.

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: АО «АКВИОН», РФ, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, 8 этаж, помещение IN – комната 11, тел.: +7 (495) 780-72-34. Все права на продукт принадлежат АО «АКВИОН».

Поставщик и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей в Республике Беларусь: ОДО «ФАРМИН», РБ, 220125, г. Минск, пр-т Независимости, 177-62, тел.: (017) 269-88-00.


Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий на территории Республики Казахстан: ТОО «НКАР», Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, проспект Сейфуллина, д. 404/67. Тел./факс: +7 (727) 388-44-89.

⁴ Флак Г. А., Саварская Е. Н., Коренева Е. А. и др. Эффективность применения энтеросорбента Комплекс с пектином Жидкий уголь® в комплексной терапии атопического дерматита у взрослых. Результаты проспективного рандомизированного клинического исследования. Дерматология (Прил. к журн. Consilium Medicum). 2019; 3: DOI: 10.26442/24143537.2019.3.190599.

CLINICALLY PROVEN:

The combination of pectin, inulin, succinic acid and taurine used in the comprehensive treatment of atopic dermatitis contributes to:

- A 3.7-time reduction of itching.
- Lessening of the disease severity.⁴



HOW TO USE «ZHIDKIJ UGOL»?



1 stick



2–3 times a day



1 hour before meals

Attention! Wait at least **1 hour** to use the intestinal adsorbent after taking any medication.

Dietary supplement «ZHIDKIJ UGOL – Orally Administered Pectin-Based Gel». This product is not a medicine.
Certificate of State Registration № RU.77.99.57.003.E.002195.06.19 dated 21.06.2019. ТУ 10.89.19-152-58693373-2018.
Presentation: 9 sticks of 10 ml.
Ingredients: carrier – polydextrose, purified water, pectin, inulin, taurine, succinic acid, apple flavor, sweetener – sucralose.

A DOSE OF 20–30 ML CONTAIN:

Ingredient	mg	% ¹
Pectin	2000–3000	100–150*
Succinic acid	100–150	50–75
Taurine	400–600	100–150*
Inulin	400–600	16–24

Nutritional value per 100 g: dietary fibers – 57 g.
Calories per 100 g: 456 kJ / 114 kcal.

¹ – % of the adequate consumption level according to the «Uniform Sanitary Epidemiological and Hygienic Requirements for the Products (Goods) Subject to Sanitary and Epidemiological Supervision (Control)» (Chapter II, Section 1, Appendix 5).
^{*} – does not exceed the maximum allowable consumption level.

Application: recommended as a dietary supplement, a source of pectin, inulin, taurine and succinic acid.

Suggested usage: for adults, 1 stick (10 ml) 2–3 times a day one hour before meals.

Contraindications: individual intolerance to the ingredients, pregnancy and breastfeeding. Consult your therapist before use.

Storage conditions: store in a dry place protected against direct sunlight at temperatures not exceeding 25 °C.

Sales: through pharmacies, specialized health food shops, and specialized departments of food stores.

Shelf life: 2 years. Batch number and date of manufacture are indicated on the package.

Manufacturer: «VTF» Ltd., Russia, 601125, Vladimirskaya Obl., Petushinsky District, Volginsky settlement, Zavodskaya st., building 107.

Organization authorized to accept claims: JSC «AKVION», Russia, 123112, Moscow, Presnenskaya embankment, 8, bld. 1, 8th floor, room IN, apt. 11. Tel.: +7 (495) 780-72-34. All rights reserved by JSC «AKVION».

The supplier and the organization authorized to accept claims from consumers in the Republic of Belarus: «FARMIN» ODO, Republic of Belarus, 220125, Minsk, 177-62 Nezavisimost' Avenue, Phone: (017) 269-88-00.


Importer and organization authorized to accept claims on the territory of the Republic of Kazakhstan: «NKAR» LLP, Republic of Kazakhstan, 050004, Almaty, Seifullin Avenue, 404/67. Tel./fax: +7 (727) 388-44-89.

⁴ G. A. Flaks, Ye. N. Savarskaya, Ye. A. Koreneva et al. Efficacy of the pectin-based intestinal adsorbent Zhidkiy Ugol in comprehensive treatment of atopic dermatitis in adults. Results of a prospective randomized clinical trial. Dermatology (Addendum to Consilium Medicum). 2019; 3: DOI: 10.26442/24143537.2019.3.190599.

КЛИНИКАЛЫҚ ДӘЛЕЛДЕНГЕН:

Атопиялық дерматиттің кешенді терапиясында пектин, инулин, шайыртас қышқылы мен таурин біріктірілімін қабылдау әсер етті:

- Қышудың айқындылығын 3,7 есе азайту.
- Ауру ағымының ауырлығын азайту.⁴



«СҰЙЫҚ КӨМІРДІ» ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА ЖӘНЕ ҚАЛАЙ ҚАБЫЛДАУ КЕРЕК?



1 стик



күніне 2–3 рет



тамақтан 1 сағат бұрын

Назар аударыңыз! Кез келген дәрілік препарат пен энтеросорбентті қабылдау арасында кемінде **1 сағат өтуі тиіс**.

Тағамға биологиялық белсенді қоспа «Сұйық көмір – пектинмен ішке қабылдауға арналған гель». Дәрілік зат болып табылмайды.
МТҚ № RU.77.99.57.003.E.002195.06.19 бастан 21.06.2019 ж. ТШ 10.89.19-152-58693373-2018.
Шығарылу түрі: 10 мл-ден 9 стиктегі.
Құрамы: толытығыш – полидекстроза, тазартылған су, пектин, инулин, таурин, шайыртас қышқылы, «алма» хош иістендіргіші, тәттілендіргіш – сукралоза.

20–30 МЛ ӨНІМДІ ҚАБЫЛДАУ КІРІСТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ:

Компоненттердің атауы	мг	% ¹
Пектин	2000–3000	100–150*
Шайыртас қышқылы	100–150	50–75
Таурин	400–600	100–150*
Инулин	400–600	16–24

100 г тағамдық құндылығы: 57 г тағамдық талшықтар.
100 г энергетикалық құндылығы: 456 кДж / 114 ккал.

¹ – тұтырудың барабар деңгейінен % «Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жатын өнімге (тауарларға) қойылатын бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптарға» сәйкес (II Тарау, 1-Бөлім, 5-Қосымша).
^{*} – тұтырудың жоғарғы рұқсат етілген деңгейінен аспайды.

Қолдану саласы: пектин, инулин, таурин, шайыртас қышқылының көзі – тағамға биологиялық белсенді қоспа ретінде ұсынылады.

Қолдану бойынша ұсыныстар: ересектерге 1 стиктен (10 мл) күніне 2–3 рет тамақтанудан бір сағат бұрын.

Қарсы көрсеткіштер: өнім компоненттеріне жеке төзбеушілік, жүктілік және емізу.

Қолданар алдында дәрігермен кеңесу ұсынылады.

Сақтау шарттары: құрғақ, күн сәулесінің тікелей түсуінен қорғалған және балалардың қолы жетпейтін жерде, 25 °С-ден жоғары емес температурада.

Сату: дәріхана мекемелері, диеталық өнімділерді сататын мамандандырылған дүкендер, азық-түлік дүкендерінің арнайы бөлімдері арқылы.

Жарамдылық мерзімі: 2 жыл. Топтама нөмірі мен шығарылу күнін қаптамадан қараңыз.

Өндіруші: «ВТФ» ЖШҚ, РФ, 601125, Владимир облысы, Петушинский ауданы, Волгинский кенті, Заводская көш., 107 құр.

Тұтынушылардан шағымдарды қабылдауға уәклетті ұйым: «АКВИОН» АҚ, РФ, 123112, Мәскеу қ., Пресненская жағалауы, 8 үй, 1 ғимарат, 8 қабат, IN үй-жайы – 11 бөлме, тел.: +7 (495) 780-72-34. «АКВИОН» АҚ-на өнімнің барлық құқықтары тиесілі.

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауардың) сапасына қатысты шағымдарын қабылдайтын, ұйымның мекенжайы: ТОО «НКАР»,

Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Сейфуллин даңғылы, 404/67.

Тел./факс: +7 (727) 388-44-89.

⁴ Г. А. Флак, Е. Н. Саварская, Е. А. Коренева және т.б. «Пектин бар Сұйық көмір кешенді атопиялық дерматиттің кешенді терапиясында кезінде ересектерде энтеросорбентті қолдану тиімділігі. Болжамды рандомизацияланған клиникалық зерттеу нәтижелері. Дерматология (Consilium Medicum журн. қосым.). 2019; 3: DOI: 10.26442/24143537.2019.3.190599.

